

Vzdělávací akce bude pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena 2 kreditními body. Každý účastník obdrží po skončení programu osvědčení o účasti.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 7. 10. 2018 telefonicky nebo e-mailem.

**Kontakt:**

Bára Bělíková, tel.: +420 725 557 143, e-mail: bbelikov@amgen.com

V průběhu semináře se bude možné připojit a sledovat program vzdáleně přes webové rozhraní.

Přihlásit se lze na [www.amgen-edukace.cz](http://www.amgen-edukace.cz).

Prosíme o přihlášení do 7. 10. 2018.

Na základě přihlášky Vám bude zaslán link pro sledování semináře.

Po skončení programu pro Vás bude připraveno pohoštění.

## Parsabiv – krok vpřed v léčbě CKD-MBD

**Chairman:**

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA  
*Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha*

17:00 – 17:05

**Úvod a přivítání**

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA

17:05 – 17:30

**Historie, přítomnost a budoucnost léčby CKD-MBD**

prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc., MBA  
*Hemodialyzační středisko FN Hradec Králové*

17:30 – 17:55

**Kalcimimetika a jejich klinické využití**

MUDr. Petr Táborský, FMC-DS s.r.o, Praha 4

17:55 – 18:25

Kazuistiky:

**1) Minimalizace perorální léčby CKD-MBD při léčbě etelkalcetidem**

MUDr. Jitka Štěpánková, Klinika nefrologie, IKEM Praha

**2) Léčba recidivy SHPT přípravkem Parsabiv**

MUDr. František Svára, Interní oddělení Strahov, VFN Praha

18:25 – 18:40

**Diskuze**

18:40 – 18:45

**Shrnutí a závěr**

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA

**POZVÁNKA**

**17. 10. 2018**  
od 17:00

**VIENNA HOUSE  
DIPLOMAT PRAGUE  
EVROPSKÁ 370/15  
PRAHA 6 – DEJVICE**

**AMGEN®**

Nephrology

Amgen s.r.o.  
Klimentská 46, 11002 Praha 1  
tel.: +420 221 773 500  
[www.amgen.cz](http://www.amgen.cz)



## Zkrácená informace o léčivém přípravku PARSABIV

▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

**Název přípravku:** Parsabiv 2,5 mg injekční roztok; Parsabiv 5 mg injekční roztok, Parsabiv 10 mg injekční roztok. **Kvalitativní a kvantitativní složení:** Jedna injekční lahvička obsahuje etelcalcetidi hydrochloridum 2,5 mg v 0,5 ml roztoku nebo 5 mg v 1 ml roztoku nebo 10 mg ve 2 ml roztoku. Jeden ml obsahuje etelcalcetidum 5 mg. **Léková forma:** Injekční roztok. **Terapeutická indikace:** Léčba sekundární hyperparatyreózy (SHPT) u dospělých pacientů s chronickým onemocněním ledvin na hemodialyzační léčbě. **Dávkování a způsob podání:** Doporučená úvodní dávka etelcalcetidu je 5 mg podaných v bolusové injekci 3x týdně. Před podáním první dávky přípravku Parsabiv, před zvýšením dávky nebo před znovuzahájením léčby po vysazení dávky má být korigovaná hladina sérového kalcia na dolní hranici normálního rozmezí nebo vyšší. Parsabiv se nemá podávat častěji než 3x týdně. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Léčba nemá být zahájena, pokud je hladina korigovaného sérového kalcia nižší než je dolní hranice normálního rozpětí. **Zvláštní upozornění a opatření pro použití:** **Hypokalcemie:** Jelikož etelcalcetid snižuje sérové kalcium, má být pacientům doporučeno, aby při výskytu symptomů hypokalcemie vyhledali lékařskou pomoc a pacienti mají být monitorováni na výskyt hypokalcemie. Hladiny sérového kalcia se mají měřit před zahájením léčby, týden po jejím zahájení nebo úpravě dávky přípravku Parsabiv a každé 4 týdny během léčby. **Zhoršení srdečního selhání:** U pacientů s anamnézou městnavého srdečního selhání léčených přípravkem Parsabiv se mají pečlivě sledovat hladiny sérového kalcia. **Souběžné podávání s jinými léčivými přípravky:** Parsabiv se podává s opatrností u pacientů, kteří jsou léčeni jinými léčivými přípravky, o nichž je známo, že snižují sérové kalcium. Je nutné pečlivě sledovat sérové kalcium. **Adynamická kost:** Adynamická kost se může rozvinout, pokud jsou hladiny PTH chronicky potlačeny pod 100 pg/ml. **Imunogenita:** Je-li podezření na tvorbu protilátek proti etelcalcetidu s klinicky významným účinkem, je třeba kontaktovat držitele rozhodnutí o registraci a probrat s ním možnosti vyšetření protilátek. **Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce:** Nebyly provedeny žádné studie interakcí. Neexistuje známé riziko farmakokinetické interakce s etelcalcetidem. Souběžné podávání jiných léčivých přípravků, o nichž je známo, že snižují sérové kalcium a přípravku Parsabiv může mít za následek zvýšené riziko hypokalcemie. Pacienti léčení přípravkem Parsabiv nemají dostávat cinakalcet. **Fertilita, těhotenství a kojení:** K dispozici nejsou žádné nebo jen omezené údaje o podávání etelcalcetidu těhotným ženám. Riziko pro kojené novorozence/kojenice nelze vyloučit. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/zdržet se podávání přípravku Parsabiv. Nejsou k dispozici klinické údaje týkající se účinku etelcalcetidu na fertilitu u člověka. **Nežádoucí účinky:** Velmi časté nežádoucí účinky přípravku Parsabiv jsou pokles sérového kalcia, svalové spasmy, průjem, nauzea a zvracení. U většiny pacientů byly mírné až středně těžké a svou povahou byly přechodné. Vysazení léčby z důvodů nežádoucích účinků bylo zejména pro nízkou hladinu sérového kalcia, nauzeu a zvracení. **Zvláštní opatření pro uchovávání:** Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Uchovávejte injekční lahvičku v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Amgen Europe B.V., Minervum 7061, NL-4817 ZK Breda, Nizozemsko **Registrační číslo:** EU/1/16/1142/001-012 **Datum revize textu:** červenec 2017

Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

URČENO PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.  
SC-CZ-AMG416-00043

Amgen s.r.o.  
Klimentská 46, 11002 Praha 1, Tel.: +420 221 773 500, www.amgen.cz

 **Parsabiv**  
(etelcalcetid)

## 15. partnerský den s ČNS Parsabiv – krok vpřed v léčbě CKD-MBD



URČENO PRO ODBORNOU VEŘEJNOST